

HiPP COMFORT

- při nadýmání, kolice* a zácpě/pri nadúvani, kolike* a zápche

Od narození/
narodenia

- Poskytuje úlevu od příznaků nadýmání, kolik* a zácpý a souvisejícího pláče./Poskytuje úlavu od príznakov nadúvania, kolík* a zápchy a súvisiaceho plácu.
- **snižené množství laktózy:** lehce stravitelné mléčné cukry. Některé děti laktózu nesnáší, proto je obsah laktózy nižší než v obvyklých kojeneckých výživách/**znižené množstvo laktózy:** ľahko stravitelné mliečne cukry. Niektoré deti laktózu neznásajú, preto je obsah laktózy nižší ako v bežných dojčenských výživách.
- **štěpená (hydrolyzovaná) bílkovina:** bílkovinné složky štěpené na malé části, které telo vnímá méně jako cizorodé a může je tak lépe strávit/**štípená (hydrolyzovaná) bielkovina:** bielkovinové zložky štiepené na malé časti, ktoré telo vnima menej ako cudzorodé a môže ich tak lepšie stráviť.
- **b-palmitát -** lehce stravitelný tuk, podle vzoru mateřského mléka/**b-palmitát -** ľahko stravitelný tuk, podľa vzoru materského mlieka.
- **mléčné kultury L. fermentum**, které se vyskytují v mateřském mléce. Mateřské mléko přirozeně obsahuje **probiotické kultury** – v individuální variabilitě a množství./**mliečne kultúry L. fermentum**, ktoré sa pridzene vyskytujú v materskom mlieku. Materské mlieko prirodzene obsahuje **probiotické kultúry** – v individuálnej variabilite a množstve.
- **galaktooligosacharidy GOS** - komplexní sacharidy z laktózy podporující růst probiotických kultur, přispívají k lepšemu zažívání/ komplexné sacharidy z laktózy podporují rast probiotických kultur, prispievajú k lepšiemu zažívaniu. Laktóza je hlavním sacharidem mateřského mléka. **Složky GOS jsou tak přirozeně obsaženy v mateřském mléce.**/ Laktóza je hlavním sacharidom materského mlieka. **Zložky GOS sú tak prirodzene obsiahnuté v materskom mlieku.**

Špičková kvalita HiPP

Při výběru surovin dodržujeme prísná legislatívna nařízenia pro kojeneckou výživu. Prísné kontroly kvality - od prvňích surovin až po konečný výrobek - zaručují nejvyšší bezpečnost pro Vás a Vaše dítě.

Pri výbere surovin dodržiavame príse legistativne nariadenia pre dojčenskú výživu. Príse kontroly kvality - od prvňich surovin až po konečný výrobok - zaručujú najvyššiu bezpečnosť pre Vás a Vaše dieťa.

Použití/ Použitie:

HiPP Comfort je nutričně kompletní kojenecká výživa určená k dietnímu postupu při nadýmání, kolice* a zácpě v kojeneckém věku a může být podávána od narození jako výlučná výživa, stejně jako od ukončeného 6.měsíce v rámci smíšené stravy u kojenců, kteří nemohou být kojeni. Při prechodu na HiPP Comfort se může změnit konzistence stolice díky **galaktooligosacharidům GOS z laktózy - stolice může být měkká** / HiPP Comfort je nutričně kompletní dojčenská výživa vhodná jako výlučný zdroj výživy pre dojčatá od narodenia rovnako ako od ukončeného 6. mesiaca veku v rámci zmiešanej stravy, pokiaľ nemôžu byť dojčené. Na diétny režim pri nadúvani, kolike* a zápche v dojčenskom veku. Pri prechode na HiPP Comfort sa môže zmeniť konzistencia stolice vďaka **galaktooligosacharidom GOS z laktózy - stolica môže byť mäksia.**

* v případech 3měsíční koliky způsobené laktózou/v případech 3mesačnej koliky spôsobenej laktózou

Podávejte pouze po poradě s lékařem./Podávajte len po porade s lekárom.

Tento produkt opustil výrobní závod v neporušeném stavu, presvedčte se prosím pred použitím, že obal zůstal nepoškozený. Foliový obal garanteuje čerstvost a aroma. / Tento produkt opustil výrobný závod v neporušenom stave, presvedčte sa prosím pred použitím, že obal zostal nepoškodený. Foliový obal garanteuje čerstvosť a arómu. Skladujte v suchu pri/pri pokojové teploté/izbovej teplote. Zabranite teplotním výkyvom/ Zabráňte teplotným výkyvom. Minimálna trvanlivosť neotevreného balenia do: viz. spodná strana / Minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď. spodná strana obalu

HiPP Comfort. Potravina pro zvláštní lékařské účely/Potravina na osobitné lekárske účely v prášku.

CZ: HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5

Infolinka(po-pá 9-14 hod.): +420 724 139 949

hipp.cz, hipp.sk

Balené: Německo/Nemecko.

2313

e 600g

Staňte se HiPP maminkou a užívejte výhod...

HiPP Baby Club

www.babycup.hipp.cz
www.babycup.hipp.sk

Výživové údaje (typické hodnoty)	100 g	100 ml připrave- né/pripravenej výživy*
Energetická hodnota/Energia	2138 kJ / 511 kcal	276 kJ / 66 kcal
Tuky z toho	27,8 g	3,6 g
- nasycené/nasýtené mastné kyseliny	12,4 g	1,6 g
- mononenasycené/mononenasýtené mastné kyseliny	11,0 g	1,4 g
- polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny, z toho	4,4 g	0,6 g
- Kyselina linolová (omega-6)	3,67 g	0,47 g
- Kyselina alfa-linolenová/linolénová (omega-3)	0,40 g	0,05 g
- Kyselina arachidonová/arachidónová (AA)	103 mg	13,2 mg
- Kyselina dokosahexaenová/ dokozahexaénová (DHA)	103 mg	13,2 mg
Sacharidy	54,3 g	7,0 g
- z toho cukry	23,1 g	3,0 g
- z toho laktóza	20,7 g	2,7 g
- z toho inositol/inozitol	33 mg	4,2 mg
- z toho škrob	11,7 g	1,5 g
Vláknina	2,4 g	0,3 g
-z toho galaktooligosacharidy	2,4 g	0,3 g
Bílkoviny/Bielkoviny **	9,80 g	1,25 g
- z toho taurin/taurín	4,80 mg	0,6 mg
- z toho L-karnitin/karnitín	9,0 mg	1,2 mg
Sůl/Sol ¹	0,40 g	0,05 g
Sodík	160 mg	20 mg
Draslík	594 mg	76 mg
Chloridy	398 mg	51 mg
Vápník/Vápník	399 mg	51 mg
Fosfor	229 mg	30 mg
Hořčík/Horčík	35 mg	4,5 mg
Železo	4,7 mg	0,6 mg
Zinek/Zinok	3,9 mg	0,5 mg
Měď/Med'	0,41 mg	0,053 mg
Mangan/Mangán	0,039 mg	0,0050 mg
Fluoridy	0,039 mg	0,0050 mg
Selen/Selén	30 µg	3,8 µg
Chróm	5,5 µg	0,70 µg
Molybden/Molybdén	18,0 µg	2,3 µg
Jód	114 µg	15 µg
Vitamin A	420 µg	54 µg
Vitamin D	12,0 µg	1,5 µg
Vitamin E	5,5 mg	0,7 mg
Vitamin K	40 µg	5,1 µg
Vitamin C	69 mg	8,9 mg
Vitamin B1	0,39 mg	0,050 mg
Vitamin B2	0,40 mg	0,051 mg
Niacin/Niacín	2,6 mg	0,34 mg
Vitamin B6	0,22 mg	0,029 mg
Kyselina listová ³	78,1 µg	10 µg
Vitamin B12	0,80 µg	0,10 µg
Kyselina pantothénová/pantothénová	2,6 mg	0,34 mg
Biotin/Biotín	12 µg	1,5 µg
Další/Dalšie výživové údaje		
Cholin/Cholín	195 mg	25 mg

1) Obsah soli je daný obsahem sodíku / obsahom sodíka v surovinách.

**hydrolyzovaná mléčná bílkovina/mliečna bielkovina (kravské mléko/mlieko).

³ ve formě folátu (Metafolin®), kdy 1 µg kyseliny listové = 1,7 µg folátu z potravin/vo forme folátu (Metafolin®), kedy 1 µg kyseliny listovej = 1,7 µg folátu z potravy.

Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u přírodních surovin/podlehají výkyvom, ktoré sú bežné pri prírodných surovinách. Balené v ochranné atmosfére/ ochrannej atmosfére. *Standardní redení/Štandardné riedenie: 12,8 g HiPP Comfort + 90 ml převařené pitné/prevarenej pitnej vody. 1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,3 g HiPP Comfort.

Hipp Comfort - při nadýmání, kolice* a zácpě/pri nadývani, kolike* a zápče

*v případech 3měsíční koliky způsobené laktózou / pripadoch 3mesačnej koliky spôsobenej laktózou

Od narození/narodenia

Složení/Zloženie LAKTOZA (z MLÉKA/MLIEKA), maltodextrin/maltodextrin, rostlinné/rastlinný oleje (palmovej*, řepkový/repkovej, slunečnicový/slniečnicový), skrob, beta-palmitát* (z palmovej*) a slunečnicový olej/slniečnicový olej), HYDROLIZOVANÁ BILKOVINA MLÉČNÉ/SYROVÁTKA/BIELOVKOVINA MLÉČNE/SRVTÁKY, galaktooligosacharidy z LAKTOZY (z MLÉKA/MLIEKA), výpenáte soli kyseliny orthofosforečnej/orthofosforenej, emulgátor, estery mono- a diglyceridu mastných kyselin s kyselinou citronovou/diglyceridy mastných kyselin s kyselinou citronovou, chlorid draselný, RYBÍ OLEJ*, cholin/cholin, olej z Mortierovej alpiná, L-fenylalanín/L-fenylalanin, L-tirosin/tirosin, hydroxid draselný, uhlíčitan hořčatiny/hořčatiny, citronan sodný, hydroxid sodný, selenan sodný, L-tryptofan/L-tryptofán, L-askorbat/askorban sodný a L-askorbyl-6-palmitát (vitamin C), uhlíčitan výpenatý, L-histidin/L-histidin, síran zinečnatý/zinočnatý, inositol/inozitol, jodičian draselný, síran zelenatý, L-karnitin/L-karnitín, DL-alfa-tokoferol acetát (vitamin E), D-pantthenát/výpenatý, mléčné kultury/mliečne kultury*, nikotinamid/nicotinamid, síran měděnatý/medynatý/čiamin/čiamin hydrochlorid (vitamin B1), retinylacetat (vitamin A), riboflavin/riboflavin (vitamin B2), síran manganiatý, pyridoxin/pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), L-methylfolat/výpenatý, fytomenadion (vitamin K), D-biotin/biotin, cholekalciferol (vitamin D), kyanokobalamin/kyanokobalamin (vitamin B12). Vztažte se/vzťahujte sa k súsenému stavu. Pozn. bez lepku/bezgluténové.

*tuky se speciální strukturou podle vzoru mateřského mléka / so špeciálnou struktúrou podľa vzoru materského mlieka. ¹Limosilactobacillus fermentum CECT5716.

³ Metafolin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti/Spoločnosť Merck KGaA, Darmstadt, SRN.

* z certifikovaného trvale udržiteľného hospodársť/ trvalo udržateľného hospodársťa

Mléčny prások může mit různé barevné variace, toto je podmieneno obsahem přírodních surovin. / Mliečny prások môže mať rôzne farebné variácie, toto je podmienené obsahom prírodných surovín.

Návod k přípravě/na prípravu: Prosím dodržujte následující doporučení. Nesprávná príprava by mohla vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Proto připravujte výživu před každým křmením čerstvou a ihned podávejte. Nesprávnebovaná časť připravenej výživy znova nepoužívajte. Lahvę a všechny její součásti vždy pečlivě myjte. Otevřete obal ihned po otevření výrobku dobre uvařte, uchovávejte v suchu a při pokojové teplotě. Spróbujte do 3 týdnů po otevření. Neohřívajte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opálení). Prosím dodržujte následující doporučení. Nesprávná príprava by mohla vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Proto připravujte výživu před každým křmením čerstvou a ihned podávejte. Nesprávnebovaná časť připravenej výživy znova nepoužívajte. Flášu a všetky její súčasti vždy dokladne myjte. Otvorený obal ihned po otevrení nezohrievajte v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).



Pitnou vodu učerňou pro kojeníce, před každou přípravou čerstvě převaréte a nechte zchladnout na teplotu cca 40-50°C. Pitnou vodu učerňou po dojatí před každou přípravou, prevarime a necháme ochladit na teplotu cca 40-50°C.



Připravenou vodu nalijeme do láhev. /
Pripravenú vodu naléjeme do fláše.



Láhev učarváme a důkladně protípremee. /
Flášu učarváme a důkladně protípremee.



Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C).
Teplotu proveríme. /
Ochladíme na teplotu vhodnou na dítce (cca 37°C). Teplotu proveríme.

*Aby nedošlo k poškození mléčných kultur (Laktobacily), nepřelijevajte výrobek příliš horkou vodou.
*Aby nedošlo k poškození mléčných kultur (Laktobacily), nezáležejte výrobek příliš horoucí vodou.

Množství/Množstvo a dávkování/dávkovanie: Může být rozdílné až základě individuálních potřeb. Uvedená tabulka je pouze orientační. /Môže byť rozdielne až základé individuálnych potrieb. Uvedená tabuľka je len orientačná. Používajte prieľoženou odmérku./Používajte priloženú odmerku.

Věk/Vek	Počet lahviček/ Počet fláší/cell	Množství připravené/ Množstvo pripravenej výživy, ml	Na jednu dávku potřebujete/potrebujete	
			Množství/Množstvo vody, ml	Počet odmérků/odmeriek
1.- 2. týden/výždeň*	4-8	70	60	2
3.- 4. týden/výždeň	7-7	100	90	3
5.- 8. týden/výždeň	5-6	135	120	4
od ukončeného 2. měsíce/mesiac	5	170	150	5
od ukončeného 4. měsíce/mesiac*	4-5	200	180	6
od ukončeného 5. měsíce/mesiac	4	235	210	7

*pokud lékár nestanoví inak. / Od ukončeného 4. měsíce můžete po dohodě s lékařem začít uvádět příkmy. Kojenici potřebují cca 4 sjedl za den. S každým nově přidánym příkmem odpadá jedno jídlo v lávici. / pokiaľ lekár nestanoví inak. ** Od ukončeného 4. mesiaca môžete po dohode s lekárom začať zavádzat príkmy. Dojčiata potrebujú cca 5 jedál za deň. S každým novým príkonom odpadá jedno jedlo vo fláši.

Důležité upozornění/Dôležité upozornenie:

- Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Pokud budete chtít Hipp Comfort, poradě se prosím s lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě.
- Hipp Comfort podávajte pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem (potravina pro vlastního lékařského účelu).
- Hipp Comfort je určená k dietetickému postupu při nadýmání, kolice a zácpě v kojeném věku a může být podávána pouze pod lékařským dohledem od narození jako výlučná výživa, stejně jako od ukončeného 6. měsíce věku v rámci zmíšené stravy.
- Poraďte se s lékárem: Hipp Comfort je vhodná i pro děti ohrožené alergií, nepoužívejte při alergii u bilkoviny kravského mléka nebo při podezření na tučnou alergii; pokud se nedostaví zlepšení po několika dnech.
- Jako mateřské mléko, obsahuje také kojenec výživu sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Často nebo trvalý kontakt zubů se sacharidy může spůsobit vznik zubního kazu. Proto nenechávejte Vaše dítě pit z lávky po dlouhou dobu a nautce ho nejdříve pit z hrnečku. Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu Vašeho dítěte.
- Nevhodné je používať Hipp Comfort na parenterální účelu.
- Dojčenie je pre Vaše dieťa to najlepšie. Pokial budete chcieť použiť Hipp Comfort, poradte sa prosim s lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmacie alebo starostlivosťi o matku a dieťa.
- Hipp Comfort podávajte len na odporúčanie lekára a pod lekárskym dohľadom (potravina na osobitné lekárske účely).
- Hipp Comfort je určená na diétny režim pri nadývani, kolike a zápcu v dojčenskom veku, a môže byť podávaná len pod lekárskym dohľadom od narodenia ako výlučná výživa, rovnako ako od ukončeného 6. mesiaca veku v rámci zmiešanej stravy.
- Dojčenie so s lekárom: Hipp Comfort je vhodná aj pre deti ohrozené alergiou; nepoužívať pri alergii u bielejviny kravského mlieka alebo pri podozrení na tučnou alergiu; pokial sa nedostaví zlepšenie po niekoľkých dňoch.
- Tak ako mateřské mlieko, aj dojčenské výživy obsahujú sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vašeho dieťaťa. Často alebo trvalý kontakt zubov so sacharidmi môže spôsobiť vznik zubného kazu. Preto nenechávejte Vaše dieťa dlho pit z fláše a nautce ho čo najskôr pit z pohárka. Venujte pozornosť výžave stravy a zdravému spôsobu života Vašeho dieťaťa.
- Nie je vhodné na parenterálné používať.